


فاصله‌ی نقطه

● مهدی قربانی
دبیر ریاضی منطقه ۹ تهران

اشاره


دستور محاسبه‌ی فاصله‌ی نقطه از خط، جزو آن دسته از روابطی است که در کتاب درسی سال اول دبیرستان مطرح شده، ولی اثبات آن نیامده است. در این جا به ارائه‌ی دو روش اثبات برای رابطه‌ی ذکر شده می‌پردازیم.

خط D به معادله‌ی $ax + by + c = 0$ و نقطه‌ی معلوم $M(x_0, y_0)$ را در نظر بگیرید. می‌خواهیم فاصله‌ی نقطه‌ی M را از خط D محاسبه کنیم. به این منظور باید طول عمودی را که از نقطه‌ی M بر خط D رسم می‌شود، محاسبه کنیم. در این جا صرف نظر از حالت‌های خاص معادله‌ی خط، حالت کلی معادله‌ی خط را در نظر می‌گیریم و به دو روش، فرمولی برای محاسبه‌ی فاصله‌ی نقطه از خط می‌یابیم.



روش اول

در شکل (۲)، از نقطه‌ی M خط D' را به موازات D رسم کرده‌ایم. فاصله‌ی این دو خط موازی، جواب مسئله خواهد بود. به منظور یافتن این فاصله، معادله‌ی خط D' را می‌نویسیم. این کار به سهولت انجام پذیر است، زیرا مختصات یک نقطه از آن، یعنی M معلوم و شیب آن نیز مساوی با شیب خط D است. پس می‌توان نوشت:



$$\left. \begin{array}{l} M(x_0, y_0) \\ m_D = m_{D'} = -\frac{a}{b} \end{array} \right\} \Rightarrow y - y_0 = m_{D'}(x - x_0)$$

$$\Rightarrow y = \frac{-a}{b}x + \frac{a}{b}x_0 + y_0$$

خط D' محور عرض‌ها را در N قطع کرده که مختصات آن به صورت زیر است:

$$x = 0 \Rightarrow y = \frac{a}{b}x_0 + y_0 = \frac{ax_0 + by_0}{b} \Rightarrow N(0, \frac{ax_0 + by_0}{b})$$

اکنون کافی است، طول پاره خط NH' را که برابر MH است، حساب کنیم. این محاسبه با استفاده از تشابه دو مثلث OPQ و $NH'P$ امکان پذیر است:

(۱)

$$\left. \begin{array}{l} \hat{P}_1 = \hat{P}_2 \\ \hat{H} = \hat{O} = 90^\circ \end{array} \right\} \Rightarrow \triangle OPQ = \triangle NH'P \Rightarrow \frac{PQ}{NP} = \frac{OQ}{NH'}$$

هریک از مقادیر PQ ، NP و OQ را به صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

$$OQ = \left| \frac{-c}{a} \right|$$

$$PQ = \sqrt{OP^2 + OQ^2} = \sqrt{\left(\frac{-c}{a}\right)^2 + \left(-\frac{c}{b}\right)^2}$$


$$= \sqrt{\frac{c^2}{a^2 \cdot b^2} (a^2 + b^2)} = \frac{|c|}{|ab|} \cdot \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$NP = ON - OP = \left| \frac{ax_0 + by_0}{b} - \frac{-c}{b} \right| = \left| \frac{ax_0 + by_0 + c}{b} \right|$$

با قرار دادن این مقادیر در تساوی ۱ خواهیم داشت:

از خط

$$MN = |y_M - y_N| = \left| y_0 + \frac{ax_0 + c}{b} \right| = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{|b|}$$



اکنون مثلث ABC با اضلاع:

$AB = |a|$ و $AC = |b|$ ، $BC = \sqrt{a^2 + b^2}$ را چنان در نظر می گیریم که وتر BC بر NH منطبق و $AC \parallel MN$ باشد. دو مثلث قائم الزامی ABC و MHN متشابه اند (چرا؟) و می توان نوشت:

$$\frac{MH}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

با جای گذاری مقادیر معلوم در تساوی اخیر خواهیم داشت:

$$\frac{MH}{|b|} = \frac{\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}}{\sqrt{a^2 + b^2}} \Rightarrow MH = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

اثبات مطلب اخیر به همین دو روش ختم نمی شود. شما می توانید با به کارگیری استعداد و خلاقیت خود، روش های دیگری را ابداع کنید. پس قلم و کاغذ به دست بگیرید و شروع کنید. موفق باشید.

نتیجه ۱: فاصله ی خط $ax + by + c = 0$ از مبدأ مختصات

$$\frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \text{ برابر است با:}$$

نتیجه ۲: فاصله ی دو خط موازی به معادلات

$$\frac{\frac{|c|}{|a|} \sqrt{a^2 + b^2}}{\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{|b|}} = \frac{\frac{|c|}{|a|}}{MH} \Rightarrow \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{|ax_0 + by_0 + c|}$$

$$= \frac{1}{MH} \Rightarrow MH = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

این رابطه نشان می دهد، برای محاسبه ی فاصله ی نقطه از خط، ابتدا معادله ی خط داده شده را به صورت $ax + by + c = 0$ می نویسیم. سپس به جای x و y، مقادیر x_0 و y_0 را جایگزین می کنیم و قدر مطلق حاصل را بر $\sqrt{a^2 + b^2}$ تقسیم می کنیم.

مثال: فاصله ی نقطه ی $A(-2, 3)$ از خط به معادله ی

$$y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2} \text{ را به دست آورید.}$$

حل:

$$y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2} \Rightarrow -3x + 4y + 2 = 0$$

$$d = \frac{|-3 \times (-2) + 4 \times 3 + 2|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{20}{5} = 4$$

روش دوم

ابتدا از M خطی بر D عمود می کنیم تا آن را در نقطه ی H قطع کند. اندازه ی پاره خط MH، همان فاصله ی M از خط D است.

سپس از نقطه ی M خطی به موازات محور عرض ها رسم می کنیم تا خط D را در نقطه ی N قطع کند (شکل ۳). مختصات نقطه ی N

عبارت است از: $N(x_0, -\frac{ax_0 + c}{b})$. (چرا؟) و طول MN چنین

خواهد شد: